


	ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер			РИ-002
	Критерии выбора дезинфицирующих средств			Копия №
Страница 1 из 4	Редакция:	В силе от:	Утвердил: 	
	1	2018-05-15	Главный врач Р.З. Султанов	

1. ПОЛИТИКА

Инструкция утверждает критерии выбора дезинфицирующих средств в ГБУЗ РКОД МЗ РБ.

2. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕССА)

ШАГ	ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЗСРЕДСТВУ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
1.	Выяснить, для каких целей планируется провести закуп дезсредства (какое подразделение, какие объекты и в каком режиме планируется обработка).	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
2.	Уточнить, разрешено ли использование данного средства в медицинской практике. Имеется ли сертификат соответствия и регистрационное удостоверение, инструкция производителя по применению.	Старшая медсестра общепольничного персонала
3.	Обратить особое внимание, при знакомстве с инструкцией по применению дезсредства, на разделы токсичности и меры предосторожности при его использовании. При наличии у средства сенсibilизирующего или кумулятивного действия, повышается риск развития аллергических реакций у персонала. Если средство обладает местно-раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и кожу, вызывает раздражение органов дыхания, его не применяют в присутствии пациентов. В медицине для дезинфекции допускаются только те препараты, которые по ГОСТу 12. 1. 007-76 относятся к четвертому классу малоопасных или третьему классу умеренно опасных соединений.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
4.	Обратить внимание на наличие доказанных данных об эффективности дезсредства при тестировании: помимо эталонных и основных патогенных (грамположительных и грамотрицательных) микроорганизмов на возбудителях полиомиелита и гепатита В, эффективность против грибов, микобактерий туберкулеза, особо опасных инфекций и спор сибирской язвы. Вывод о высокой эффективности препарата против широкого спектра микроорганизмов позволяют сделать исследования на возбудителях полиомиелита и гепатита В.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
5.	Уточнить информацию о возможности использования в присутствии пациентов и нетребовательность к использованию индивидуальных средств защиты для медперсонала.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного



	Это значит, что препарат относится к умеренно или малоопасному классу опасности дезсредств.	персонала, старшие медсестры отделений
6.	Рабочие растворы должны быть (по возможности) многократного применения даже при высокой степени белковой нагрузки; средство должно хорошо растворяться в воде. Также рабочие растворы должны использоваться при максимально возможном количестве различных режимов дезинфекции и иметь способность сохранять антимикробную активность в присутствии органических загрязнений, что является косвенным показателем эффективности препарата.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
7.	Дезсредства должны обладать высокой моющей способностью. Обычно ей обладают препараты с показателем pH рабочего раствора больше 7 и/или с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ) с моющим эффектом. Препараты с показателем pH рабочего раствора менее 7 (кислотная среда) могут обладать коррозионным эффектом и это должно учитываться при выборе обрабатываемой поверхности. Препараты с нейтральным или близким к нему значением pH наиболее эффективны.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
8.	Уточнить срок годности концентрата, который должен быть не менее 3 лет, а срок годности рабочего раствора не менее 7 суток, что является косвенным показателем сохранения активности препарата.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
9.	Форма выпуска должна быть в виде таблеток или жидкого концентрата. Упаковка в виде канистры разрабатывается для минимизации контакта медперсонала с дезсредством и для удобства приготовления рабочего раствора (наличие дозатора, дозировочной таблицы и шкалы на каждой канистре).	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
10.	Дезсредство должно сохранять свои свойства после замораживания и оттаивания.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
11.	Должны отсутствовать сильные и резкие запахи.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений



12.	Должно быть малое время экспозиции рабочего раствора при различных режимах дезинфекции (не более 5 – 10 – 30 – 60 минут), ДВУ (не более 5 – 10 – 20 – 60 минут), стерилизации (20 – 30 – 60 минут).	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
13.	Обращать внимание на стоимость не только 1л (кг) концентрата, но и проводить перерасчет стоимости рабочего раствора. Дезсредства выпускаются либо в виде готового раствора, в виде концентрата, порошка, таблеток. Перерасчет стоимости 1 л концентрата на стоимость 1 л рабочего раствора покажет ценовые преимущества дезсредства, которое оказывает максимальный эффект при различных видах дезинфекции (дезинфекция ИМН, ДВУ, стерилизация) при наиболее низких концентрациях действующего вещества в рабочем растворе с сохранением эффективности действия.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
14.	Дезсредство должно иметь возможность универсального применения (методом орошения, погружения, протирания).	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
15.	Должна иметься возможность совмещения дезинфекции и предстерилизационной очистки в одном этапе. Возможность дезинфекции оборудования сложной конфигурации.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
16.	Повреждающее воздействие на объекты дезинфекции должно быть низкое, должна отсутствовать коррозионная активность.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
17.	Должна быть возможность контроля за содержанием активно действующего вещества - наличие экспресс - методов (тест - полоски для определения концентрации рабочего раствора).	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
18.	Должно отсутствовать фиксирующее действие на органические вещества.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие

	Страница 4 из 4	Редакция:1	В силе от: 2018-05-15	РИ-002
---	-----------------	------------	-----------------------	--------

		медсестры отделений
19.	Дезсредство должно быть экологически безопасно - разлагаться во внешней среде до нейтральных химических компонентов (водород, кислород, вода).	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
20.	Должна отсутствовать пожаро - и взрывоопасность.	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений
21.	Должно быть удобно в использовании (простота в приготовлении, применении).	Зав. ОДС и Э, главная медсестра, старшая медсестра общепольничного персонала, старшие медсестры отделений

Использованные документы:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
- Инструкции к дезсредствам, разрешенным к использованию на территории РФ, имеющим сертификат соответствия.